

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE



**"G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI"**

Via Raffaello Sanzio, 187 - 50053 Empoli (FI)

tel. 0571/81.041 e 0571/944273 - fax 0571/81042 - email: info@iisferraris.it

COD. FISC. 91017160481 - COD. MECC. FIIS012007

Circ. n. 702

EMPOLI, 7/05/2015

A tutti gli alunni  
A tutti i genitori  
A tutti i docenti  
A tutto il personale

OGGETTO: Nota informativa sulla campagna di vaccinazione antimeningococco

Si allega la nota informativa in oggetto con indicazione di lettura da parte di tutti gli interessati e di lettura in tutte le classi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
- Prof.ssa Daniela Mancini -  
*mefuini*

*Fu comunicato  
col dire e obcol  
07.*

**Oggetto:** ANOMALIA MESSAGGIO: Antimeningococco - Nota informativa sulla campagna di vaccinazione

**Mittente:** "Per conto di: joomla@usl8.toscana.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

**Data:** 04/05/2015 23.35

**A:** ISTITUTO SUPERIORE <FIIS012007@pec.istruzione.it>

Anomalia nel messaggio

Il giorno 04/05/2015 alle ore 23:35:05 (+0200) è stato ricevuto il messaggio "Antimeningococco - Nota informativa sulla campagna di vaccinazione" proveniente da "joomla@usl8.toscana.it" ed indirizzato a:  
fiis012007@pec.istruzione.it

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:  
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile  
Il messaggio originale è incluso in allegato.

—postacert.eml—

**Oggetto:** Antimeningococco - Nota informativa sulla campagna di vaccinazione

**Mittente:** Newsletter Ausl8 <newsletter@usl8.toscana.it>

**Data:** 04/05/2015 23.35

**A:** ISTITUTO SUPERIORE <FIIS012007@pec.istruzione.it>

## **Antimeningococco**

### **Nota informativa sulla campagna di vaccinazione**

→ La Regione Toscana, visto il manifestarsi di numerosi casi di meningite e sepsi da meningococco in prevalenza di tipo C nei primi mesi del 2015, ha intrapreso una campagna di vaccinazione antimeningococcica con l'utilizzo del vaccino coniugato ACWY offerto attivamente e prioritariamente ai ragazzi maggiormente a rischio ovvero dal compimento del 11° anno fino al compimento del 20° anno di età.

Dal 21° anno al compimento dei 45 anni - dal momento che il rischio di malattia meningococcica si riduce progressivamente con l'età - la vaccinazione sarà resa disponibile a chi ne farà richiesta;

Dopo i 45 anni l'incidenza di malattia meningococcica si riduce ulteriormente (DGRT n 571 del 27.04.2015): è comunque consigliabile a chi lavora a stretto contatto respiratorio con il pubblico e a chi frequenta luoghi chiusi affollati.

I medici daranno priorità vaccinale agli assistiti affetti da immunodeficienza (con difese immunitarie basse).

Vaccino somministrato nella campagna 2015

Vaccino tetravalente coniugato con CRM197 oppure coniugato alla proteina vettore del tossoide tetanico contro sierogruppi A,C,Y,W135; non contiene adiuvanti né conservanti; è indicato per soggetti di età compresa tra 2 e 65 anni.

#### DOVE RIVOLGERSI

→ I soggetti di età compresa tra gli 11 ed i 20 anni potranno rivolgersi al proprio pediatra o al proprio medico di famiglia. Al medico di famiglia, se interessati, potranno rivolgersi anche i soggetti di età compresa tra i 21 ed i 45 anni.

→ Tutti i soggetti di età compresa tra gli 11 ed i 20 anni potranno effettuare la vaccinazione anche presso gli ambulatori dei centri vaccinali individuati in ogni Zona Distretto previo appuntamento tramite CUPTEL al numero 800 57 58 00 (attivo dalle ore 7,45 alle ore 17,30).

Per informazioni sulle sedi vaccinali è possibile chiamare il numero 800 61 3311 dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.

**MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO**

Iniezione singola da 0.5 ml intramuscolare, preferibilmente muscolo deltoide.

**POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI SEGNALATI PIU' FREQUENTEMENTE**

Nella sede di iniezione: dolore, eritema, indurimento, prurito. A livello sistemico: cefalea, nausea, dolori muscolari e articolari, capogiro, febbre.

Si raccomanda di segnalare al medico vaccinatore ogni evento inatteso eventualmente osservato.

**CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE ALLA VACCINAZIONE**

ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti, o precedenti gravi reazioni avverse (anafilassi) allo stesso vaccino o a sue componenti.

**CONTROINDICAZIONI RELATIVE evento febbrile acuto.**

Gravidanza: dati clinici non ancora sufficienti.

---

Allegati:

---

postacert.eml

16,1 KB